



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 149 Sintesi nazionale

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 13/03/2023-19/03/2023
(aggiornati al 22/03/2023)



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 22 marzo 2023 relativi alla settimana 13/3/2023-19/3/2023

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 08/03/2023)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	556	13.4	15	0.98 (CI: 0.86-1.12)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Moderata	No
Basilicata	128	5.0	-7	0.15 (CI: 0.02-0.41)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	1	Moderata	No
Calabria	409	-16.0	-3	0.87 (CI: 0.7-1.05)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Campania	1692	-9.7	28	1.06 (CI: 0.94-1.19)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	1	Moderata	No
Emilia-Romagna	1562	-15.7	3	0.99 (CI: 0.87-1.13)	No	Bassa	Bassa	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia	1	Moderata #	No
FVG	541	-2.5	2	1.07 (CI: 0.97-1.16)	No	Moderata	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Moderata	No
Lazio	3161	-16.8	-115	0.67 (CI: 0.61-0.74)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No
Liguria	458	14.4	6	1.06 (CI: 0.93-1.18)	No	Moderata	Bassa	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia	1	Alta #	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 08/03/2023)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Lombardia	4405	0.8	3	1.03 (CI: 0.97-1.09)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	1	Moderata	No
Marche	328	-9.9	-14	0.98 (CI: 0.82-1.16)	No	Bassa	Bassa	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e totale risorse umane sottosoglia	1	Moderata #	No
Molise	48	50.0	1	0.44 (CI: 0.13-0.85)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	1	Moderata	No
Piemonte	1045	-9.1	1	3.88 (CI: 3.4-4.41) [§]	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	4	Moderata	No
PA Bolzano/Bozen	345	-7.7	-6	1.04 (CI: 0.91-1.18)	No	Bassa	Bassa	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e totale risorse umane sottosoglia	1	Moderata #	No
PA Trento	267	-8.2	0	1.21 (CI: 1.06-1.37)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	2	Bassa	No
Puglia	900	0.0	2	0.93 (CI: 0.82-1.05)	No	Bassa	Bassa	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia	1	Moderata #	No
Sardegna	383	-12.1	-3	0.93 (CI: 0.75-1.14)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia	1	Bassa	No
Sicilia	214	-12.3	-12	0 (CI: 0-0) ^{&}	No	Non valutabile	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Non valutabile (equiparata a rischio alto)	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 08/03/2023)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Toscana	1279	-5.5	0	0.98 (CI: 0.92-1.05)	No	Bassa	Bassa	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia	1	Moderata #	No
Umbria	435	-20.2	0	1.29 (CI: 1.06-1.54)	No	Bassa	Bassa	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia	2	Bassa	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	28	7.7	0	0.87 (CI: 0.56-1.22)	No	Moderata	Bassa	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	1	Moderata	No
Veneto	3289	-8.6	14	0.94 (CI: 0.9-0.99)	No	Bassa	Bassa	0 allerte di resilienza	1	Bassa	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni;

*ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale";

presenza di molteplici allerte di resilienza;

[§]La regione Piemonte comunica che l'Rt sintomi non è affidabile in quanto calcolato su dati in fase di aggiornamento

[&]La regione Sicilia ha comunicato di non aver inserito tutti i dati relativi alle ultime due settimane a causa di una revisione in corso del sistema informatico



Ministero della Salute



Dimensione 1 - completezza dei dati

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			

Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 22 marzo 2023 relativi alla settimana 13/3/2023-19/3/2023

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
Abruzzo	98.6	99.0	Sopra soglia	100.0	100	99.6
Basilicata	100.0	100.0	Sopra soglia	NaN	NaN	100.0
Calabria	97.5	97.7	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Campania	100.0	99.8	Sopra soglia	100.0	100	99.6
Emilia-Romagna	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	97.1
FVG	99.2	99.3	Sopra soglia	100.0	100	99.7
Lazio	97.0	96.8	Sopra soglia	100.0	100	94.7
Liguria	69.2	66.9	Sopra soglia	100.0	100	95.9
Lombardia	75.7	73.2	Sopra soglia	100.0	100	97.4
Marche	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Molise	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Piemonte	98.3	99.5	Sopra soglia	100.0	NaN	96.5
PA Bolzano/Bozen	100.0	99.9	Sopra soglia	100.0	100	96.2
PA Trento	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	93.4
Puglia	100.0	100.0	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Sardegna	94.2	95.8	Sopra soglia	100.0	100	100.0
Sicilia	84.5	59.9*	Sottosoglia	100.0	100	87.5
Toscana	89.0	88.5	Sopra soglia	100.0	100	99.9
Umbria	75.2	74.4	Sopra soglia	100.0	100	100.0
V.d'Aosta/V.d'Aoste	100.0	100.0	Sopra soglia	94.7	NaN	99.3
Veneto	96.4	96.1	Sopra soglia	99.7	100	100.0

*La regione Sicilia ha comunicato di non aver inserito tutti i dati relativi alle ultime due settimane a causa di una revisione in corso del sistema informatico



Ministero della Salute



Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Stabilità di trasmissione	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e ≤ 1 in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID- 19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact- tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



Nota Metodologica

NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto

Stima di Rt: La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

Valutazione del Rischio: nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

Dati sui focolai: appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

Casi importati: La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

Scenario settimanale di riferimento: viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1$ e $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1,25$ e $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto: Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione (in area medica e in terapia intensiva) sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

Occupazione posti letto: si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 22 marzo 2023 relativi alla settimana 13/3/2023-19/3/2023

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	1022	10.3	13.4	0.98 (CI: 0.86-1.12)	48	355	0%	4%
Basilicata	185	17.6	5.0	0.15 (CI: 0.02-0.41)	6	0	0%	3%
Calabria	935	-7.6	-16.0	0.87 (CI: 0.7-1.05)	8	38	2%	9%
Campania	3616	-10.1	-9.7	1.06 (CI: 0.94-1.19)	165	582	1%	5%
Emilia-Romagna	3506	-16.0	-15.7	0.99 (CI: 0.87-1.13)	1	1443	3%	5%
FVG	1183	-8.6	-2.5	1.07 (CI: 0.97-1.16)	59	408	1%	6%
Lazio	6762	-16.0	-16.8	0.67 (CI: 0.61-0.74)	50	123	2%	6%
Liguria	965	17.8	14.4	1.06 (CI: 0.93-1.18)	33	444	1%	6%
Lombardia	8854	4.6	0.8	1.03 (CI: 0.97-1.09)	78	4368	0%	2%
Marche	793	2.8	-9.9	0.98 (CI: 0.82-1.16) #	24	136	0%	2%
Molise	85	57.6	50.0	0.44 (CI: 0.13-0.85)	4	0	5%	2%
Piemonte	2401	-7.3	-9.1	3.88 (CI: 3.4-4.41) §	47	398	1%	2%
PA Bolzano/Bozen	704	-10.8	-7.7	1.04 (CI: 0.91-1.18)	23	264	3%	9%
PA Trento	568	-6.1	-8.2	1.21 (CI: 1.06-1.37)	0	0	2%	7%
Puglia	1877	-2.2	0.0	0.93 (CI: 0.82-1.05)	5	838	1%	3%
Sardegna	831	-17.4	-12.1	0.93 (CI: 0.75-1.14)	17	192	2%	6%
Sicilia	2015	-14.1	-12.3	0 (CI: 0-0) #	43	967	2%	6%
Toscana	2744	-3.3	-5.5	0.98 (CI: 0.92-1.05)	79	1247	1%	3%
Umbria	1009	-22.7	-20.2	1.29 (CI: 1.06-1.54)	1	311	1%	10%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	83	96.4	7.7	0.87 (CI: 0.56-1.22) #	0	27	0%	7%
Veneto	6899	-8.4	-8.6	0.94 (CI: 0.9-0.99)	33	532	1%	4%

*dato aggiornato al giorno 21/03/2023 (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore).

Le seguenti Regioni/PPAA presentano un disallineamento tra i due flussi (dati aggregati Ministero della Salute e dati individuali ISS) negli ultimi 7 giorni: Sicilia 77,01% (problemi tecnici), Valle d'Aosta 49,09% e Marche 18,41%; il dato Rt Sicilia non è affidabile

§ La regione Piemonte comunica che l'Rt sintomi non è affidabile in quanto calcolato su dati in fase di aggiornamento.

Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese* *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione in setting ospedalieri/PS Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
Possibilità di garantire adeguate risorse per contact- tracing, isolamento e quarantena	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
Abruzzo	10%	9%	1	0	0.6 per 10000	0.6 per 10000	1.3 per 10000	76.6%	0 allerte di resilienza
Basilicata	5%	6%	0	0	1.5 per 10000	3.7 per 10000	5.2 per 10000	93.4%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Calabria	4%	4%	0	0	0.5 per 10000	1.1 per 10000	1.6 per 10000	90.2%	0 allerte di resilienza
Campania	6%	6%	1	1	0.4 per 10000	0.6 per 10000	0.9 per 10000	96.4%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia
Emilia-Romagna	6%	6%	1	Non calcolabile	0.2 per 10000	0.3 per 10000	0.4 per 10000	23.7%	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia
FVG	15%	15%	1	1	0.5 per 10000	0.7 per 10000	1.2 per 10000	98.3%	0 allerte di resilienza
Lazio	7%	7%	1	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	89.8%	0 allerte di resilienza
Liguria	5%	5%	0	0	0.2 per 10000	0.5 per 10000	0.7 per 10000	73.4%	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia
Lombardia	1%	1%	1	Non calcolabile	0.4 per 10000	0.3 per 10000	0.8 per 10000	97.6%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia
Marche	14%	17%	0	0	0.1 per 10000	0.1 per 10000	0.1 per 10000	100%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e totale risorse umane sottosoglia

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
Molise	2%	3%	0	0	1.1 per 10000	2.7 per 10000	3.8 per 10000	100%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Piemonte	5%	4%	2	Non calcolabile	0.3 per 10000	0.4 per 10000	0.8 per 10000	100%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia
PA Bolzano/Bozen	3%	4%	0	0	0.4 per 10000	0.2 per 10000	0.6 per 10000	97%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e totale risorse umane sottosoglia
PA Trento	19%	20%	2	2	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Puglia	9%	9%	0	0	0.3 per 10000	0.5 per 10000	0.7 per 10000	47.3%	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia
Sardegna	9%	6%	0	1	0.1 per 10000	8.5 per 10000	8.6 per 10000	65.9%	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 sottosoglia
Sicilia	3%	3%	Non calcolabile	Non calcolabile	0.7 per 10000	1 per 10000	1.7 per 10000	89.6%	0 allerte di resilienza
Toscana	34%	33%	0	3	0 per 10000	0.7 per 10000	0.7 per 10000	89.6%	2 allerte di resilienza. Totale risorse umane e ind 2.6 sottosoglia
Umbria	14%	8%	0	0	0.1 per 10000	0.1 per 10000	0.3 per 10000	95.1%	1 allerta di resilienza. Totale risorse umane sottosoglia
V.d'Aosta/V.d'Aoste	5%	6%	2	2	0.4 per 10000	0.6 per 10000	1 per 10000	98.8%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Veneto	4%	4%	1	1	1 per 10000	1.8 per 10000	2.9 per 10000	83.9%	0 allerte di resilienza

*le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

** in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

#Come concordato con le Regioni/PPAA (specificato in Verbale Cabina di Regia del 23/7/2021), si considera il trend dell'indicatore 2.1 con % di positività arrotondata al suo valore intero più prossimo.