

---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

---

# Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

## Report 41 Sintesi nazionale

---

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)  
Dati relativi alla settimana 15/2/2021-21/2/2021  
(aggiornati al 24/2/2021)

---

Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 24 febbraio 2021 relativi alla settimana 15/2/2021-21/2/2021

Regione.PA	Incidenza per 100.000 ab	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 10/02/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
	7gg		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	221,34	2864	↓	↑	<b>1.13 (CI: 1.07-1.17)</b>	No	<b>Moderata</b>	<b>Alta</b>	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 5%	2	<b>Alta</b>	No
Basilicata	116,04	642	↑	↓	<b>1.51 (CI: 1.26-1.79)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	<b>3</b>	<b>Moderata</b>	No
Calabria	56,33	1067	↓	↑	<b>1.01 (CI: 0.9-1.12)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 5%	1	<b>Moderata</b>	No
Campania	157,10	8974	↓	↑	<b>1.04 (CI: 0.96-1.13)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata ad alta probabilità di progressione</b>	No
Emilia-Romagna	243,72	10880	↑	↑	<b>1.1 (CI: 1.07-1.13)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 15%	2	<b>Moderata ad alta probabilità di progressione</b>	No
FVG	140,94	1700	↓	↓	0.83 (CI: 0.79-0.88)	No	Bassa	<b>Alta</b>	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata</b>	No
Lazio	106,73	6143	↓	↓	0.94 (CI: 0.91-0.97)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Liguria	130,57	1991	↓	↓	0.94 (CI: 0.88-0.99)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Lombardia	171,29	17176	↑	↑	0.82 (CI: 0.79-0.84)	No	<b>Moderata</b>	<b>Alta</b>	2 allerte segnalate. Ind 2.1 in aumento e sopra 20%. Ind 2.6 in diminuzione e sotto 90%	1	<b>Alta</b>	No
Marche	177,10	2679	↑	↑	0.98 (CI: 0.88-1.09)	No	<b>Moderata</b>	<b>Alta</b>	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 10%	1	<b>Alta</b>	No
Molise	214,96	646	↑	↓	<b>1.11 (CI: 0.8-1.45)</b>	No	<b>Moderata</b>	<b>Moderata</b>	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata ad alta probabilità di progressione</b>	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Incidenza per 100.000 ab	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 10/02/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
	7gg		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Piemonte	125,72	5420	↑	↑	<b>1.02 (CI: 0.98-1.05)</b>	<b>Si</b>	<b>Alta</b>	Bassa	<b>2 allerte segnalate.</b> Ind 2.1 in aumento e sopra 5%. Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali.	1	<b>Alta</b>	No
PA Bolzano/Bozen	539,01	2871	↓	↑	0.92 (CI: 0.89-0.96)	No	Bassa	<b>Alta</b>	0 allerte segnalate	1	<b>Moderata</b>	No
PA Trento	309,12	1686	↑	↑	<b>1.07 (CI: 1-1.14)</b>	No	<b>Moderata</b>	<b>Moderata</b>	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento e sopra 15%	2	<b>Moderata ad alta probabilità di progressione</b>	No
Puglia	128,88	5095	↓	↑	0.95 (CI: 0.92-0.98)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Sardegna	29,47	475	↓	↓	0.68 (CI: 0.61-0.74)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Sicilia	58,83	2868	↓	↓	0.71 (CI: 0.67-0.75)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Toscana	159,89	5904	↑	↑	<b>1.19 (CI: 1.15-1.23)</b>	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	2	<b>Moderata ad alta probabilità di progressione</b>	No
Umbria	225,93	1966	↓	↑	<b>1.07 (CI: 1.02-1.12)</b>	No	<b>Moderata</b>	<b>Alta</b>	0 allerte segnalate	2	<b>Alta</b>	<b>Si</b>
V.d'Aosta/V.d'Aoste	46,39	58	↓	↑	0.94 (CI: 0.67-1.26)	No	Bassa	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento e sopra 5%	1	Bassa	No
Veneto	112,07	5468	↑	↓	0.97 (CI: 0.94-1.01)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento	1	<b>Moderata</b>	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni

\* ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"



## Dimensione 1 - completezza dei dati

### Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
<b>Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)</b>	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	<p>Almeno il 60% con trend in miglioramento</p> <p>Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020</p>	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 24 febbraio 2021 relativi alla settimana 15/2/2021-21/2/2021

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
Abruzzo	93.5	96.1	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	99.6
Basilicata	99.7	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	75.0	100.0
Calabria	90.0	94.3	Stabilmente sopra-soglia	98.0	100.0	99.9
Campania	90.9	91.7	Stabilmente sopra-soglia	99.8	100.0	99.0
Emilia-Romagna	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	99.7
FVG	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	99.9
Lazio	93.9	94.4	Stabilmente sopra-soglia	99.7	100.0	85.6
Liguria	96.2	96.1	Stabilmente sopra-soglia	99.9	100.0	98.1
Lombardia	75.3	71.3	Stabilmente sopra-soglia	99.9	100.0	98.7
Marche	100.0	99.9	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	100.0
Molise	96.1	95.4	Stabilmente sopra-soglia	99.3	100.0	100.0
Piemonte	82.6	80.3	Stabilmente sopra-soglia	99.1	99.6	98.8
PA Bolzano/Bozen	86.1	85.7	Stabilmente sopra-soglia	99.8	100.0	99.5
PA Trento	100.0	99.7	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	97.3
Puglia	96.4	97.2	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	100.0
Sardegna	96.1	95.9	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	100.0
Sicilia	92.0	87.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	99.4
Toscana	97.8	97.7	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	99.4
Umbria	95.8	92.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	99.5
V.d'Aosta/V.d'Aoste	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	100.0
Veneto	92.5	90.4	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100.0	100.0



## Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

### Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
<b>Stabilità di trasmissione</b>	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e $\leq 1$ in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione  Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact-tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
<b>Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi</b>	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



## **Nota Metodologica**

**NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto**

**Stima di Rt:** La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

**Valutazione del Rischio:** nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

**Dati sui focolai:** appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

**Casi importati:** La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

**Scenario settimanale di riferimento:** viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1$  e  $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra  $Rt=1,25$  e  $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

**Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto:** Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed area medica **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

**Occupazione posti letto:** si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.

Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 24 febbraio 2021 relativi alla settimana 15/2/2021-21/2/2021

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	5685	<b>40.6</b>	-1.2	<b>1.13 (CI: 1.07-1.17)</b>	543	1538	<b>38%</b>	39%
Basilicata	1159	<b>5.1</b>	<b>10.7</b>	<b>1.51 (CI: 1.26-1.79)</b>	9	3	6%	19%
Calabria	2395	-7.6	-10.1	<b>1.01 (CI: 0.9-1.12)</b>	20	59	12%	20%
Campania	20983	-5.4	-2.3	<b>1.04 (CI: 0.96-1.13)</b>	1046	1635	21%	32%
Emilia-Romagna	19094	<b>16.8</b>	<b>19.8</b>	<b>1.1 (CI: 1.07-1.13)</b>	101	5131	26%	33%
FVG	3851	-10.9	-4.6	0.83 (CI: 0.79-0.88)	246	859	<b>33%</b>	28%
Lazio	13394	-5.5	-7.4	0.94 (CI: 0.91-0.97)	206	162	24%	29%
Liguria	4025	-5.2	-5.8	0.94 (CI: 0.88-0.99)	254	117	25%	28%
Lombardia	29795	<b>19.2</b>	<b>24.4</b>	0.82 (CI: 0.79-0.84)	1640	9108	<b>33%</b>	38%
Marche	5598	<b>9.9</b>	<b>17.1</b>	0.98 (CI: 0.88-1.09)	168	1165	<b>33%</b>	<b>47%</b>
Molise	1207	-4.1	<b>14.4</b>	<b>1.11 (CI: 0.8-1.45)</b>	10	0	<b>38%</b>	<b>48%</b>
Piemonte	10670	<b>8.1</b>	<b>6.0</b>	<b>1.02 (CI: 0.98-1.05)</b>	830	1491	23%	33%
PA Bolzano/Bozen	7109	-26.2	-26.3	0.92 (CI: 0.89-0.96)	4	391	<b>33%</b>	<b>47%</b>
PA Trento	3074	<b>16.0</b>	<b>21.7</b>	<b>1.07 (CI: 1-1.14)</b>	21	1486	<b>36%</b>	30%
Puglia	11369	-12.6	-10.9	0.95 (CI: 0.92-0.98)	112	2690	29%	35%
Sardegna	1161	-29.3	-30.5	0.68 (CI: 0.61-0.74)	122	62	12%	15%
Sicilia	7436	-22.5	-11.1	0.71 (CI: 0.67-0.75)	291	1323	16%	21%
Toscana	10203	<b>14.5</b>	<b>26.0</b>	<b>1.19 (CI: 1.15-1.23)</b>	653	2445	28%	16%
Umbria	4508	-17.9	-17.2	<b>1.07 (CI: 1.02-1.12)</b>	349	622	<b>56%</b>	<b>56%</b>
V.d'Aosta/V.d'Aoste	121	-16.7	-3.3	0.94 (CI: 0.67-1.26)	17	24	0%	3%
Veneto	9671	<b>8.5</b>	<b>20.2</b>	0.97 (CI: 0.94-1.01)	1016	1067	10%	13%

\* dato aggiornato al giorno 23/02/2021



## Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

### Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
<b>Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti</b>	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese.*  *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione e in setting ospedalieri/PS  Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS  VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
<b>Possibilità di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena</b>	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1 (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
Abruzzo	7.1%	<b>8.5%</b>	2	2	0.8 per 10000	1 per 10000	1.8 per 10000	98.6%	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 5%
Basilicata	9.5%	7.5%	1	-2	1.8 per 10000	4.4 per 10000	6.2 per 10000	94.1%	0 allerte segnalate
Calabria	7.4%	<b>7.8%</b>	2	1	0.9 per 10000	0.6 per 10000	1.5 per 10000	94.5%	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 5%
Campania	12.1%	11.6%	1	Non calcolabile	0.9 per 10000	1.7 per 10000	2.7 per 10000	94.4%	0 allerte segnalate
Emilia-Romagna	12.8%	<b>15.1%</b>	2	Non calcolabile	1.2 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	94.2%	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 15%
FVG	7.8%	7.6%	2	2	1.2 per 10000	1.2 per 10000	2.4 per 10000	98.3%	0 allerte segnalate
Lazio	18.7%	16.8%	3	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	96.5%	0 allerte segnalate
Liguria	8.8%	8%	2	1	1 per 10000	0.9 per 10000	1.9 per 10000	97.9%	0 allerte segnalate
Lombardia	20.7%	<b>23.1%</b>	3	Non calcolabile	0.9 per 10000	0.9 per 10000	1.8 per 10000	<b>86.1%</b>	2 allerte segnalate. Ind 2.1 in aumento e sopra 20%. Ind 2.6 in diminuzione e sotto 90%
Marche	8.7%	<b>10.1%</b>	2	2	1 per 10000	1.5 per 10000	2.6 per 10000	100%	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 10%
Molise	12.1%	11.4%	0	0	1.1 per 10000	2.9 per 10000	3.9 per 10000	100%	0 allerte segnalate
Piemonte	7%	<b>7.5%</b>	4	1	1.4 per 10000	1.9 per 10000	3.3 per 10000	98.7%	2 allerte segnalate. Ind 2.1 in aumento e sopra 5%. Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali.
PA Bolzano/Bozen	49.7%	41.4%	2	2	5.6 per 10000	1.4 per 10000	7 per 10000	100%	0 allerte segnalate
PA Trento	16.4%	<b>16.9%</b>	2	2	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	1 allerta segnalata. Ind 2.1 in aumento e sopra 15%
Puglia	18.4%	15.9%	3	3	1 per 10000	1.1 per 10000	2.2 per 10000	95.9%	0 allerte segnalate
Sardegna	5.4%	4.1%	4	3	0.6 per 10000	1.9 per 10000	2.5 per 10000	96.9%	0 allerte segnalate
Sicilia	11.9%	9.1%	2	Non calcolabile	0.8 per 10000	2.2 per 10000	2.9 per 10000	91.1%	0 allerte segnalate
Toscana	8.4%	6.8%	1	2	1.9 per 10000	1.5 per 10000	3.4 per 10000	100%	0 allerte segnalate

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1 (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
Umbria	17.5%	16.7%	3	1	0.9 per 10000	3 per 10000	4 per 10000	100%	0 allerte segnalate
V.d'Aosta/V.d'Aoste	6.4%	<b>7.2%</b>	2	1	2 per 10000	2.4 per 10000	4.4 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento e sopra 5%
Veneto	4.4%	<b>4.7%</b>	1	0	1 per 10000	1.8 per 10000	2.8 per 10000	92.8%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento

\* le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

\*\* in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

Appendice - Tabella 5 – Incidenza cumulativa per COVID-19 (per 100,000 ab) per Regione/PA, a 7 e 14gg, dati al 24 febbraio 2021 relativi alla settimana 15/2/2021-21/2/2021; Fonte ISS

Regione/PA	Numero di casi totale	Incidenza cumulativa per 100,000 ab	Diagnosi ultimi 7 gg	Incidenza 7 gg per 100,000 ab (15/2-21/2)	Diagnosi ultimi 14gg	Incidenza 14gg
Abruzzo	51.767	4.000,72	2.864	221,34	5.759	445,07
Basilicata	14.732	2.662,79	642	116,04	1.211	218,89
Calabria	36.959	1.951,26	1.067	56,33	2.217	117,05
Campania	247.887	4.339,65	8.974	157,10	18.439	322,80
Emilia-Romagna	249.423	5.587,28	10.880	243,72	19.959	447,10
Friuli-Venezia Giulia	69.623	5.772,02	1.700	140,94	3.476	288,17
Lazio	232.909	4.046,58	6.143	106,73	12.753	221,57
Liguria	76.312	5.004,64	1.991	130,57	4.002	262,46
Lombardia	585.408	5.837,97	17.176	171,29	30.988	309,03
Marche	62.048	4.101,88	2.679	177,10	5.286	349,45
Molise	10.293	3.425,11	646	214,96	1.210	402,64
Piemonte	241.279	5.596,54	5.420	125,72	10.534	244,34
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen	51.517	9.671,94	2.871	539,01	6.813	1.279,09
Provincia Autonoma di Trento	33.308	6.106,80	1.686	309,12	3.076	563,96
Puglia	142.619	3.607,59	5.095	128,88	11.118	281,23
Sardegna	40.288	2.499,84	475	29,47	1.138	70,61
Sicilia	151.282	3.103,04	2.868	58,83	6.440	132,09
Toscana	150.180	4.067,10	5.904	159,89	10.640	288,15
Umbria	43.749	5.027,67	1.966	225,93	4.377	503,01
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	7.988	6.388,66	58	46,39	122	97,57
Veneto	330.090	6.765,34	5.468	112,07	9.974	204,42
<b>Italia</b>	<b>2.829.661</b>	<b>4.744,45</b>	<b>86.573</b>	<b>145,16</b>	<b>169.532</b>	<b>284,25</b>