



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 87
Sintesi nazionale

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 3/01/2022-9/01/2022
(aggiornati al 12/1/2022)



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 12 gennaio 2022 relativi alla settimana 3/1/2022-9/1/2022

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 29/12/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	28487	↑	↑	1.44 (CI: 1.39-1.49) **	No	Non valutabile	Basso	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	3	Non valutabile (equiparato a rischio)	No
Basilicata	5764	↑	↑	2.3 (CI: 2.13-2.49)	No	Moderata	Basso	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	4	Moderato	No
Calabria	5612	↑	↑	1.22 (CI: 1.15-1.3)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.3 >3	2	Alto #	No
Campania	90389	↑	↑	2.16 (CI: 2.15-2.18)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.3 >3	4	Alto (ad alta probabilità di progressione) #	No
Emilia-Romagna	117122	↑	↓	1.84 (CI: 1.83-1.85)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 in diminuzione	4	Alto (ad alta probabilità di progressione) #	No
FVG	8908	↓	↑	1.61 (CI: 1.58-1.64)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 non valutabile e Ind	4	Alto #	No
Lazio	79670	↑	↑	1.13 (CI: 1.1-1.15)	No	Moderata	Basso	0 allerte di resilienza	2	Moderato	No
Liguria	26208	↑	↑	1.26 (CI: 1.23-1.29) **	No	Non valutabile	Basso	0 allerte di resilienza	2	Non valutabile (equiparato a rischio alto) #, §	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 29/12/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Lombardia	272920	↑	↑	2.16 (CI: 2.16-2.17)	No	Moderata	Basso	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	4	Moderato (ad alta probabilità di progressione)	No
Marche	11877	↑	↑	0.98 (CI: 0.9-1.06)	No	Moderata	Basso	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	1	Moderato (ad alta probabilità di progressione)	No
Molise	2388	↑	↑	1.9 (CI: 1.28-2.52)	No	Moderata	Basso	0 allerte di resilienza	3	Moderato (ad alta probabilità di progressione)	No
Piemonte	91014	↑	↑	1.88 (CI: 1.86-1.9)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e	4	Alto (ad alta probabilità di progressione)	No
PA Bolzano/Bozen	1163	↓	↑	1.29 (CI: 1.22-1.35)	No	Moderata	Basso	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	2	Moderato	No
PA Trento	14280	↑	↑	2.15 (CI: 2.07-2.24)	No	Moderata	Alto	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	4	Alto (ad alta probabilità di progressione)	No
Puglia	32079	↑	↑	2 (CI: 1.95-2.05)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%	4	Alto (ad alta probabilità di progressione) #	No
Sardegna	5509	↓	↑	1.86 (CI: 1.79-1.93)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%	4	Alto #	No
Sicilia	18692	↓	↑	1.29 (CI: 1.26-1.34)	No	Moderata	Basso	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento	3	Moderato (ad alta probabilità di progressione)	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 29/12/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Toscana	19531	↓	↑	1.41 (CI: 1.39-1.43)	No	Moderata	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%	3	Alto (ad alta probabilità di progressione) #	No
Umbria	19403	↑	↑	1.39 (CI: 1.35-1.44)	No	Moderata	Basso	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 <75%	3	Moderato (ad alta probabilità di progressione)	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	3660	↑	↑	1.48 (CI: 1.37-1.58)	No	Moderata	Moderato	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%	3	Alto (ad alta probabilità di progressione) #	Si
Veneto	106211	↑	↑	1.34 (CI: 1.32-1.35) **	No	Non valutabile	Basso	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%	3	Non valutabile (equiparato a rischio alto)#,§	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni; *ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"

La classificazione complessiva di rischio è alta in quanto sono state registrate molteplici allerte di resilienza (vedere tabella 4 dell'appendice)

§ Ai sensi del DM del 30 aprile 2020 tali Regioni/PPAA sono da considerarsi non valutabili a poiché l'indicatore 1.1 risulta essere al di sotto della soglia critica, posta al 60%

** La stima dell'Rt puntuale è da considerarsi meno affidabile in quanto la completezza del dato misurata dall'indicatore 1.1 è al di sotto della soglia di qualità prevista.



Ministero della Salute



Dimensione 1 - completezza dei dati

Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			

Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 12 gennaio 2022 relativi alla settimana 3/1/2022-9/1/2022

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
Abruzzo	23.3	13.1	Sotto soglia (<60%)	99.6	100.0	97.5
Basilicata	99.2	99.7	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	100.0
Calabria	93.6	90.6	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	99.8
Campania	100.0	83.0	Sopra soglia, in diminuzione	100.0	100.0	99.7
Emilia-Romagna	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	98.7
FVG	99.9	99.9	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	99.9
Lazio	94.0	92.9	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	96.2
Liguria	64.4	52.1	Sotto soglia (<60%)	100.0	100.0	95.9
Lombardia	77.6	73.1	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	97.0
Marche	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	97.4	100.0
Molise	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	100.0
Piemonte	93.1	77.9	Sopra soglia, in diminuzione	99.4	100.0	93.9
PA Bolzano/Bozen	96.3	96.2	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	99.0
PA Trento	100.0	100.0	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	87.4
Puglia	95.1	95.3	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	100.0
Sardegna	98.8	98.9	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	100.0
Sicilia	91.6	89.6	Stabilmente sopra soglia	99.9	100.0	99.5
Toscana	94.2	92.7	Stabilmente sopra soglia	100.0	100.0	99.8
Umbria	43.5	66.2	Sopra soglia, in aumento	100.0	100.0	99.8
V.d'Aosta/V.d'Aoste	61.0	95.4	Sopra soglia, in aumento	100.0	100.0	99.6
Veneto *	59.3	46.3	Sotto soglia (<60%)	100.0	100.0	100.0

*La Regione Veneto comunica che "sta attuando opportune attività per migliorare il recupero delle informazioni mancanti" - dovute ad un attacco hacker subito nelle settimane precedenti - "e rafforzare le attività di contact tracing in tutti i contesti pur riscontrando le difficoltà legate al contesto epidemiologico".



Ministero della Salute



Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Stabilità di trasmissione	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e ≤ 1 in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt > 1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID- 19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact- tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



Nota Metodologica

NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto

Stima di Rt: La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

Valutazione del Rischio: nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

Dati sui focolai: appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

Casi importati: La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

Scenario settimanale di riferimento: viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1$ e $Rt=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1,25$ e $Rt=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto: Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione (in area medica e in terapia intensiva) sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

Occupazione posti letto: si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 12 gennaio 2022 relativi alla settimana 3/1/2022-9/1/2022

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	43928	90.7	75.8	1.44 (CI: 1.39-1.49) **	905	6642	18%	26%
Basilicata	9116	77.8	55.7	2.3 (CI: 2.13-2.49)	17	75	3%	21%
Calabria	22360	52.8	61.2 #	1.22 (CI: 1.15-1.3)	151	1745	20%	38%
Campania	151546	35.2	29.9	2.16 (CI: 2.15-2.18)	8811	22358	12%	25%
Emilia-Romagna	168272	139.2	62.0	1.84 (CI: 1.83-1.85)	0	100235	17%	24%
FVG	32632	105.5	-20.3 #	1.61 (CI: 1.58-1.64)	1170	19225	21%	28%
Lazio	132220	80.6	64.7	1.13 (CI: 1.1-1.15)	8542	1125	21%	25%
Liguria	25228	26.3	23.0	1.26 (CI: 1.23-1.29) **	2798	2015	20%	38%
Lombardia	466999	39.7	29.7	2.16 (CI: 2.16-2.17)	8700	207401	17%	31%
Marche	21947	35.4	36.7	0.98 (CI: 0.9-1.06)	598	7656	22%	25%
Molise	3956	40.2	23.2	1.9 (CI: 1.28-2.52)	29	0	5%	13%
Piemonte	147488	66.7	56.3	1.88 (CI: 1.86-1.9)	14468	39936	24%	33%
PA Bolzano/Bozen	12808	148.0	-58.8 #	1.29 (CI: 1.22-1.35)	935	5308	17%	15%
PA Trento	20399	119.2	109.1	2.15 (CI: 2.07-2.24)	1917	4318	31%	24%
Puglia	59837	71.2	11.3	2 (CI: 1.95-2.05)	801	19705	10%	17%
Sardegna	12874	47.5	-5.1 #	1.86 (CI: 1.79-1.93)	866	3331	14%	13%
Sicilia	94941	140.0	-17.4 #	1.29 (CI: 1.26-1.34)	3763	25236	20%	32%
Toscana	164653	39.7	-40.5 #	1.41 (CI: 1.39-1.43)	2030	93133	21%	22%
Umbria	36929	12.6	7.4	1.39 (CI: 1.35-1.44)	669	17933	16%	30%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	5173	100.8	87.1	1.48 (CI: 1.37-1.58)	150	3212	18%	54%
Veneto	156320	77.3	69.2	1.34 (CI: 1.32-1.35) **	14180	68900	20%	25%

*dato aggiornato al giorno 11/1/2022 (denominatore posti letto attivi e attivabili entro 24 ore);

#Regioni/PPAA dove è stato rilevato un forte ritardo di notifica dei casi nel flusso ISS che potrebbe rendere la valutazione di questi indicatori meno affidabile;

**La stima dell'Rt puntuale è da considerarsi meno affidabile in quanto la completezza del dato misurata dall'indicatore 1.1 è al di sotto della soglia di qualità prevista.

Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese* *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione in setting ospedalieri/PS Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
Possibilità di garantire adeguate risorse per contact- tracing, isolamento e quarantena	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
Abruzzo	12%	24%	2	Non calcolabile	0.7 per 10000	0.9 per 10000	1.6 per 10000	81.3%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Basilicata	21%	33%	5	0	2.4 per 10000	4.3 per 10000	6.7 per 10000	99.4%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Calabria	12%	16%	0	4	0.6 per 10000	1.2 per 10000	1.7 per 10000	83.1%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.3 >3
Campania	30%	31%	5	6	0.8 per 10000	1.5 per 10000	2.2 per 10000	89.8%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.3 >3
Emilia-Romagna	34%	46%	2	Non calcolabile	1 per 10000	1 per 10000	2.1 per 10000	86.9%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 in diminuzione
FVG§	30%	20%	2	1	0.8 per 10000	1.2 per 10000	2 per 10000	42.5%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 non valutabile e Ind 2.6 <75%
Lazio	41%	41%	1	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	87.8%	0 allerte di resilienza
Liguria	27%	24%	5	Non calcolabile	0.5 per 10000	0.7 per 10000	1.1 per 10000	95.5%	0 allerte di resilienza
Lombardia	11%	13%	2	Non calcolabile	0.4 per 10000	0.6 per 10000	1.1 per 10000	86.1%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Marche	17%	22%	0	0	0.5 per 10000	0.7 per 10000	1.3 per 10000	100%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Molise##	21%	18%	0	0	1.1 per 10000	2.6 per 10000	3.7 per 10000	100%	0 allerte di resilienza
Piemonte	18%	30%	2	Non calcolabile	1.1 per 10000	1.5 per 10000	2.6 per 10000	88.8%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 in diminuzione
PA Bolzano/Bozen	11%	16%	2	2	1.7 per 10000	2.2 per 10000	3.8 per 10000	85.8%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1# (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
PA Trento	30%	32%	2	2	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Puglia	14%	25%	1	1	0.5 per 10000	0.8 per 10000	1.3 per 10000	60%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%
Sardegna	19%	28%	3	1	0.2 per 10000	1.2 per 10000	1.3 per 10000	71.3%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%
Sicilia	26%	29%	2	Non calcolabile	1 per 10000	2.1 per 10000	3.1 per 10000	87.5%	1 allerta di resilienza. Ind 2.1 in aumento
Toscana	40%	50%	0	3	0.8 per 10000	0.8 per 10000	1.6 per 10000	55.5%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%
Umbria	35%	35%	3	2	0.6 per 10000	1.9 per 10000	2.4 per 10000	52.8%	1 allerta di resilienza. Ind 2.6 <75%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	12%	21%	2	0	0.4 per 10000	1.6 per 10000	2 per 10000	39.3%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%
Veneto ***	10%	19%	1	1	1 per 10000	1.8 per 10000	2.9 per 10000	26%	2 allerte di resilienza. Ind 2.1 in aumento e Ind 2.6 <75%

*le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

** in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

#Come concordato con le Regioni/PPAA (specificato in Verbale Cabina di Regia del 16/7/2021), si considera il trend dell'indicatore 2.1 con % di positività arrotondata al suo valore intero più prossimo.

La Regione Molise ha confermato l'indicatore 2.6 relativo al mese di novembre 2021.

§ La Regione Friuli-Venezia Giulia ha il comunicato che l'indicatore 2.1 non è valutabile in quanto, nel conteggio della settimana corrente, sono stati inseriti anche i tamponi provenienti da farmacia

***La Regione Veneto comunica che "sta attuando opportune attività per migliorare il recupero delle informazioni mancanti" - dovute ad un attacco hacker subito nelle settimane precedenti – "e rafforzare le attività di contact tracing in tutti i contesti pur riscontrando le difficoltà legate al contesto epidemiologico".