



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE

A

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA
SALUTE – NAS Sede Centrale

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO P.S.
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

U.S.M.A.F. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA,
AEREA E DI FRONTIERA

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL
TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL
TURISMO

DIREZIONE GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO VI

C/O MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMANDO GENERALE CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
CENTRALE OPERATIVA

DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E
FARMACO VETERINARIO

ENAC
DIREZIONE SVILUPPO TRASPORTO AEREO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
UNITA' DI CRISI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CROCE ROSSA ITALIANA
REPARTO NAZIONALE DI SANITA' PUBBLICA

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA'

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI”

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE DELLA POVERTA'(INMP)

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO
UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO

OGGETTO: FEBBRE GIALLA IN BRASILE

6 marzo 2017

Aggiornamento sulle raccomandazioni per la vaccinazione contro la febbre gialla per i viaggiatori internazionali in relazione alla situazione attuale in Brasile

Alla data del 3 marzo 2017, la trasmissione del virus della febbre gialla continua ad espandersi verso la costa atlantica del Brasile in aree non ritenute a rischio di trasmissione di febbre gialla precedentemente alla revisione della valutazione del rischio, effettuata dal gruppo consultivo scientifico e tecnico sulla mappatura geografica del rischio di febbre gialla (GRYF), e pubblicata dall'OMS il 27 gennaio 2017 fra i comunicati sulle epidemie, e il 31 gennaio 2017 e 14 febbraio 2017 sul sito web dell'OMS relativo a Viaggi Internazionali e Salute.

Tenendo in considerazione la velocità di diffusione osservata nello Stato di Espírito Santo, la prossimità dell'area urbana di Vitória ai casi umani ed epizootici per i quali sono in corso gli accertamenti per infezione da febbre gialla, e l'implementazione della campagna di vaccinazione contro la febbre gialla in tutto lo Stato di Espírito Santo, il Segretariato dell'OMS ha determinato che tutto lo Stato di Espírito Santo debba essere considerato a rischio per la trasmissione della febbre gialla.

Pertanto la vaccinazione contro la febbre gialla è raccomandata ai viaggiatori internazionali che abbiano intenzione di recarsi in qualsiasi località dello Stato di Espírito Santo.

Non sono state apportate alter modifiche alle altre aree del Brasile considerate a rischio di trasmissione della febbre gialla nel 2013 e pubblicate dall'OMS nel comunicato del 27 gennaio 2017.

La determinazione di nuove aree considerate a rischio per la trasmissione della febbre gialla deve essere considerata provvisoria e sarà aggiornata regolarmente.

Le raccomandazioni attuali del Segretariato dell'OMS rivolte ai viaggiatori internazionali diretti in aree del Brasile considerate a rischio, incluso tutto lo Stato di Espírito Santo, sono le seguenti:

- vaccinazione contro la febbre gialla almeno 10 giorni prima della partenza. In base all'allegato 7 del Regolamento Sanitario Internazionale (2005), una singola dose di vaccino contro la febbre gialla approvato dall'OMS è sufficiente a conferire un'immunità costante e una protezione che dura per tutta la vita contro la febbre gialla. Si raccomanda di consultare un medico se esistono controindicazioni alla somministrazione del vaccino contro la febbre gialla (bambini di età inferiore a 9 mesi, donne in gravidanza o che allattano, persone con grave ipersensibilità agli antigeni delle uova, e grave immunodeficienza) o ai viaggiatori di età superiore a 60 anni;
- adozione di misure per evitare le punture di zanzara;
- conoscenza dei sintomi causati dalla febbre gialla;
- rivolgersi a un medico in caso di insorgenza di sintomi compatibili con la febbre gialla durante il viaggio o al ritorno a casa essendosi recati in aree a rischio di trasmissione della febbre gialla.

Sono disponibili sul sito web dell'OMS Viaggi Internazionali e Salute gli aggiornamenti per il 2017 sui requisiti relativi al Certificato Internazionale di Vaccinazione, con prova dell'effettuata vaccinazione contro la febbre gialla, e le raccomandazioni dell'OMS sulla vaccinazione per i viaggiatori internazionali: allegato 1 e lista dei paesi. Informazioni più specifiche sui requisiti per il Certificato Internazionale di Vaccinazione con prova dell'effettuata vaccinazione contro la febbre gialla implementati dai Paesi Membri nella Regione delle Americhe sono disponibili sul sito web dell'OPS sulla febbre gialla.

Per approfondire:

<http://www.who.int/csr/don/06-march-2017-yellow-fever-brazil/en/>

<http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/>

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/>

Patrizia Parodi

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO V
* F.to Dott. Francesco Maraglino

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"