



Distribuzione annuale dei casi di AIDS, dei casi corretti per ritardo di notifica, dei decessi, del tasso di letalità e del tasso di incidenza




Distribuzione annuale dei casi di AIDS, dei casi corretti per ritardo di notifica, dei decessi e del tasso di letalità

Anni	Casi diagnosticati	Casi corretti per ritardo di notifica	Morti per anno di decesso	Decessi per anno di diagnosi	Tasso di letalità
1982	1	1	0	0	0
1983	8	8	2	7	87.5
1984	37	37	16	37	100
1985	198	198	89	186	93.9
1986	458	458	268	436	5.2
1987	1030	1030	563	973	94.5
1988	1775	1775	857	1664	93.7
1989	2483	2483	1407	2326	93.7
1990	3135	3135	1947	2918	93.1
1991	3829	3829	2620	3545	92.6
1992	4258	4258	3279	3864	90.7
1993	4803	4803	3670	4047	84.3
1994	5506	5506	4335	4408	80.1
1995	5653	5653	4581	3815	67.5
1996	5052	5052	4201	2456	48.6
1997	3378	3378	2147	1196	35.4
1998	2441	2441	1069	727	29.8
1999	2133	2133	774	571	26.8
2000	1948	1948	683	438	22.5
2001	1812	1812	638	361	19.9
2002	1755	1759	485	309	17.6
2003	1716	1727	498	303	17.7
2004	1602	1627	430	230	14.4
2005	1452	1507	327	162	11.2
2006*	758	868	160	67	8.8
Totale	57221	57425	35046	35046	61.2

Distribuzione annuale dei casi prevalenti di AIDS




Età mediana alla diagnosi per sesso ed anno di diagnosi




*Dati a Nov. 2006

Distribuzione percentuale dei casi di AIDS per nazionalità anagrafica


Italiana Estera




Distribuzione dei casi di AIDS in adulti per categoria di esposizione e per anno di diagnosi




Uso di terapie antiretrovirali e regime terapeutico pre-AIDS



Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS per categoria di trasmissione



Persone che scoprono la loro HIV-positività alla diagnosi di AIDS: 1996-2006*



*Dati a Nov. 2006

HIV in Italia: stime

Totale infezioni HIV dall'inizio dell'epidemia **140-180.000**

Persone con HIV (AIDS incluso) nel 2006 **110-130.000**

Percentuale donne: 30-35%

1986 **Nuove infezioni HIV** **14-18.000**

Principale modalità di trasmissione:
uso di droghe per via endovenosa

2006 **Nuove infezioni HIV nel 2006** **3500-4.000**

Principale modalità di trasmissione:
rapporti sessuali
Stranieri oltre il 20%
