

Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2017 (coorte 2014)

Coperture* vaccinali a 36 mesi (per 100 abitanti), calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC	EP A	ROTA	Men B	Men ACYW
Piemonte	95,91	95,86	96,24	95,85	95,24	94,72	94,71	94,71	94,71	3,86	91,44	91,71	1,54	5,91	0,00	0,00
Valle d'Aosta	93,84	93,74	94,41	93,74	93,55	93,36	91,18	90,90	91,18	2,46	90,81	89,38	0,19	0,19	3,51	0,19
Lombardia	94,99	94,99	95,24	94,96	94,65	93,90	94,53	93,98	94,08	2,08	91,59	90,28	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	90,65	90,65	90,85	90,56	90,10	89,80	78,13	77,97	78,02	10,96	71,85	83,89	2,11	0,94	5,96	0,09
Prv. Aut. Trento	94,02	93,94	94,41	93,85	93,30	92,89	91,96	91,90	91,94	56,83	88,51	89,14	4,85	0,76	23,83	1,27
Veneto	93,33	93,32	93,99	93,31	92,49	92,25	92,47	92,29	92,42	89,00	92,82	87,92	13,42	2,78	18,44	90,77
Friuli-Venezia Giulia	91,89	91,68	92,54	91,62	90,63	90,22	90,27	90,27	90,27	80,60	88,06	83,67	5,22	2,24	25,07	4,21
Liguria	95,15	95,15	95,22	95,11	94,92	94,18	91,93	91,73	91,84	59,00	84,49	91,64	5,15	17,00	40,23	9,88
Emilia-Romagna	95,40	95,19	95,78	95,17	94,75	93,88	91,92	91,62	91,75	4,57	93,47	91,74	9,95	3,96	2,46	36,44
Toscana	93,63	93,60	93,92	93,56	93,12	93,12	91,91	91,79	91,86	86,67	92,77	91,02	0,90	7,44	67,62	15,82
Umbria	96,00	95,87	96,13	95,89	95,96	95,68	94,93	94,85	94,95	2,12	92,15	93,49	0,61	0,00	11,72	0,38
Marche	93,40	93,18	93,45	93,17	92,82	92,44	90,44	90,26	90,33	43,47	85,93	89,34	1,57	0,77	16,61	5,96
Lazio	97,47	97,45	97,45	97,44	97,42	97,27	94,03	94,03	94,03	13,42	85,98	93,31	0,42	4,99	29,06	34,00
Abruzzo	97,81	97,80	97,80	97,80	97,79	97,77	90,18	90,18	90,18	27,03	71,05	90,92	0,31	0,58	12,66	11,25
Molise	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22	98,22	85,68	85,68	85,68	67,05	81,88	97,62	0,00	0,00	0,73	1,01
Campania	93,61	93,62	92,91	93,61	93,55	93,55	89,97	89,99	89,98	51,31	65,93	84,45	0,08	0,34	3,17	3,47
Puglia	95,56	95,55	95,56	95,55	95,40	95,29	93,01	93,01	93,01	90,50	85,99	91,86	75,66	21,22	72,81	1,29
Basilicata	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80	94,04	94,04	94,04	86,61	91,27	98,10	0,23	0,70	71,40	0,08
Calabria	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30	98,18	93,02	93,02	93,02	72,71	70,95	93,60	0,46	8,84	12,12	45,94
Sicilia	94,20	94,20	94,32	94,20	94,19	94,15	90,15	90,14	90,14	87,68	76,29	90,65	0,03	45,85	10,55	2,92
Sardegna	96,59	96,53	96,58	96,52	96,49	96,18	93,54	93,53	93,51	82,54	90,38	95,11	0,01	13,93	13,46	0,06
Italia	95,05	95,02	95,18	95,00	94,72	94,39	92,38	92,23	92,27	43,52	85,22	90,35	8,85	10,16	21,86	20,85

Legenda:

- (a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi
- (b) Ciclo di base 1, 2 o 3 dosi, secondo l'età
- (c) 1a dose
- (d) Ciclo completo secondo il prodotto o il calendario
- n.d. Non disponibile

POL	Polio(a)	ROS	Rosolia (c)
DIF	Difterite (a)	VAR	Varicella (c)
TET	Tetano (a)	Men C	Meningococco C coniugato (b)
PER	Pertosse (a)	PNC	Pneumococco coniugato (b)
EP B	Epatite B(a)	EP A	Epatite A (d)
HIB	Hib(b)	ROTA	Rotavirus (d)
MOR	Morbillo(c)	Men B	Meningococco B (d)
PAR	Parotite (c)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato (c)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 11 dicembre 2018