Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio V
Malattie Infettive e Profilassi Internazione

N. DGPPREV.V/27497/P/I.4.c.9

Risposta al Foglio del

OGGETTO: Vaccinazione Antinfluenzale – Modalità di offerta

Roma 25 novembre 2005

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni a Statuto Ordinario e a Statuto Speciale
LORO SEDI

Agli Assessorati alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

e p.c.

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema - Ministero della Salute
SEDE

Istituto Superiore di Sanità
ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo n°80/A
ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Ordine dei Farmacisti
Via Palestro n°75
ROMA

Nelle ultime settimane stanno giungendo, a questa Direzione Generale, segnalazioni che riferiscono circa la programmazione di appuntamenti, presso ASL/Medici di Medicina Generale, per la somministrazione di dosi di richiamo per la vaccinazione antinfluenzale (corrente stagione 2005-2006), ovvero della somministrazione di due dosi di vaccino nella stessa seduta, "giustificate" da un "carente stato di salute del soggetto".

Fermo restando che la somministrazione di eventuali dosi di richiamo dei vaccini dovrebbe essere effettuata in base a specifiche schedule e mai nella stessa seduta vaccinale, si ribadisce che un'adeguata e protettiva copertura anticorpale è garantita dalla somministrazione di una singola dose di vaccino

antinfluenzale, come peraltro previsto nella Circolare Ministeriale n°1 del 5 agosto 2005, "Prevenzione e Controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2005-2006":

"…Poiché la maggior parte della popolazione è stata, con tutta probabilità, infettata dai virus influenzali A/H3N2, A/H1N1 e B nel corso degli ultimi anni, una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dell'età infantile. Per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi appropriate per l'età di vaccino antinfluenzale, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane per assicurare una soddisfacente risposta immunitaria; la seconda dose di vaccino dovrebbe preferibilmente essere somministrata entro la fine di novembre, primi giorni di dicembre…".

Si richiama l'attenzione inoltre, sull'importanza del rispetto di tali indicazioni anche alla luce della aumentata adesione alla campagna di vaccinazione corrente che, qualora non fosse condotta in modo appropriato, potrebbe creare una carenza nell'offerta della stessa per le categorie cui è prioritariamente indirizzata.

Si prega di voler dare massima diffusione della presente ai servizi e soggetti interessati.

OC

F.to Il Direttore dell'Ufficio V
Dott.ssa Maria Grazia Pompa

F.to Il Direttore Generale
Dott. Donato Greco