

Vaccinazione antinfluenzale: stagione 2008-2009
Coperture vaccinali (per 100 abitanti) stimate dal Ministero della Salute,
sulla base dei riepiloghi inviati da Regioni e Province Autonome.

Regione/P.A.	CLASSI DI ETA'					
	< 5 anni	5-14 anni	15-24 anni	25-64 anni	>=65 anni	Totale
Piemonte	1,7	1,9	1,5	6,7	60,7	17,9
Valle d'Aosta	1,0	1,0	0,8	5,9	54,5	14,8
Lombardia	2,4	2,3	1,2	4,9	61,7	15,5
P.A. Bolzano	1,3	1,4	1,9	4,5	50,8	11,7
P. A. Trento	1,8	1,7	1,2	5,3	68,0	16,3
Veneto	3,3	3,4	2,0	8,1	71,6	19,3
FVG	1,4	1,8	1,7	8,2	68,1	20,7
Liguria	5,4	4,2	4,2	8,7	65,7	23,2
Emilia Romagna	2,6	4,2	3,7	11,5	73,7	23,9
Toscana	9,9	6,5	3,3	9,7	69,5	22,8
Umbria	1,8	1,5	1,3	7,6	74,7	21,8
Marche	4,5	3,9	2,6	9,0	66,9	20,8
Lazio	2,7	3,5	2,8	10,4	67,9	19,9
Abruzzo	6,2	5,3	2,0	7,6	68,4	19,7
Molise	8,9	7,4	3,4	11,3	72,3	23,4
Campania	6,7	6,2	3,9	10,9	72,2	18,8
Puglia	18,7	13,8	4,4	12,1	73,8	22,7
Basilicata	2,3	3,1	1,4	3,7	72,2	19,4
Calabria	4,2	2,9	1,8	7,5	69,8	17,7
Sicilia	3,0	2,9	4,4	10,4	61,0	17,7
Sardegna	6,2	5,0	2,9	7,1	49,6	14,2
ITALIA	4,6	4,0	2,5	8,2	66,3	19,1

GGIORNAMENTO 8 novembre 2010

Fonte: elaborazioni del MINISTERO DELLA SALUTE -
 DG PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO V - Malattie Infettive e Profilassi Internazionale
 Informazioni: Dr.ssa Elvira Rizzuto, e.rizzuto@sanita.it