

• الغثيان

• ألم العضلات أو المفاصل

الآثار الجانبية الشائعة (تهم شخصا واحدا من أصل 10 أشخاص):

• إحمرار أو انتفاخ مكان الحقن

• الحمى (أكثر من 38 درجة مئوية)

• الغثيان (القيء) أو الإسهال

• انخفاض نسبة الصفائح في الدم

الآثار الجانبية الأقل شيوعا (تهم شخصا واحدا من أصل 100 شخص):

• النعاس أو الدوار

• فقدان الشهية

• تضخم حجم الغدد اللمفاوية

• العرق الشديد، الحكة أو الطفح الجلدي

الآثار الجانبية النادرة (تهم شخصا واحدا من أصل 1000 شخص):

• تجلطات دم غير عادية (على مستوى الدماغ، الأمعاء، الكبد، الطحال) مصحوبة بانخفاض نسبة الصفائح في الدم.

في حال ظهور أية أعراض، و لو لم تدرج ضمن الآثار المشار إليها أعلاه، يتوخى إخبار الطبيب المعالج أو مركز التلقيح.

من الممكن الإعلام عن الآثار الجانبية مباشرة عبر البرنامج الوطني للمراقبة التابع لوكالة الأدوية الإيطالية

(<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-averse>)

العناصر المكونة للقاح

العنصر النشط هو أدينو فيروس من الشمبزي غير قابل للانتساخ و يعمل على تشفير بروتين سارس كوف-2 سبايك.

يحتوي الدواء على كائنات معدلة وراثيا.

العناصر المكونة الأخرى إضافة إلى سائل الحقن هي:

L-istidina; L-istidina cloridrato monoidrato; cloruro di magnesio esaidrato; polisorbato 80 (E 433);
saccaroso; disodio edetato (diidrato)